RODENTICIDES

CATALOGUE TECHNIQUE DE PRODUITS ET GUIDE D'UTILISATION
DE MEILLEURS APPÂTS. DE MEILLEURS RÉSULTATS

SyrVet Canada

TOUT POUR LE CONTRÔLE DES RONGEURS

Havoc® TERMINATOR Ramik®

Programme de contrôle des rongeurs en 4 étapes

Contrôler les rats et les souris à l'intérieur comme à l'extérieur !

1 Première étape: PRÉVENIR

Nettoyer, vider et mettre en place des mesures préventives

Éliminer les débris et les amoncèlements de matière qui pourraient servir d'abris aux rongeurs autour des bâtiments.

Retirer toutes les sources de nourriture facilement accessibles aux rongeurs incluant la nourriture renversée. L'élimination des sources d'alimentation des rongeurs augmente l'efficacité des appâts.

Nettoyer/tondre 1 mètre (3 pi.) autour des bâtiments afin de décourager les rongeurs d'entrer.

2 Deuxième étape: IDENTIFIER

Trouver la source et la sévérité du problème

Il est préférable de procéder à l'examen à l'aube ou à la tombée de la nuit.

Y a-t-il des excréments frais, des terriers, des pistes ou des éléments fraîchement rongés ?

Bien inspecter les plafonds, les endroits surélevés et le sol des installations.

Avez-vous des rats, des souris ou les deux ?

3 Troisième étape: AGIR

Mettre en œuvre la stratégie selon le type de rongeurs ciblés et le lieu d'intervention

À l'extérieur: Utiliser des stations d'appâts et y déposer à l'intérieur les emballages de mini appâts Ramik®, les blocs ou barres Ramik® ou les blocs Terminator® et remplacer les appâts mangés au moins une fois par semaine au début du programme.

À l'intérieur: Utiliser soit les appâts Havoc-XT Blok®, les emballages de mini appâts Havoc® ou Ramik®, les blocs ou barres Ramik® ou les blocs Terminator®. Placer les sacs d'appâts dans les greniers, les plafonds ou tout autre endroit difficile d'accès où se cachent les rongeurs.

Déterminer les endroits où les rats et les souris seront les plus aptes à trouver les appâts. Généralement, ces emplacements sont le long des murs, près des endroits où il y a des traces de rongement, près des terriers, dans les coins ou les endroits dissimulés, entre les plafonds et les murs ou dans les endroits où les rongeurs ont été vus. Protéger les appâts de la pluie ou de la neige et enlever le plus de source de nourriture alternative possible.

Contacter SyrVet Canada pour des suggestions spécifiques de stratégies de positionnement d'appâts.

4 Quatrième étape: SURVEILLER

Surveiller l'efficacité de votre programme en place en gardant un registre

La fréquence de positionnement d'appâts change avec l'augmentation de l'activité des rongeurs.



Saviez-vous?

- Les rats et les souris sont connus pour transporter et transmettre aux humains et aux animaux d'élevage plus de 35 maladies transmissibles.
- Chaque année, au moins 20 % des réserves mondiales de nourriture est mangé ou contaminé par les rats et souris.
- Les déjections et l'urine des rongeurs sont des sources de maladies gastro-intestinales dues à la bactérie salmonelle et la bactérie E. Coli.

TERMINATOR

APPÂTS À BASE DE BROMÉTHALINE

Appâts résistants à l'eau pour rats et souris

La Bromethaline a été développée pour lutter contre le problème de résistance des rongeurs à la warfarine comme anticoagulant rodenticide. La Bromethaline n'est pas un anticoagulant mais un rodenticide neurotoxique très puissant qui fournit une dose létale dans l'alimentation en seulement une nuit. Les premiers rongeurs morts apparaissent après seulement 2 jours. Ce type d'appâts est disponible sous forme de blocs.

- Les rongeurs cessent de s'alimenter après avoir consommé la dose mortelle; il en résulte une consommation moindre d'appâts de l'ordre de 80% comparativement aux appâts classiques.
- Aucune résistance connue à cette formulation neurotoxique
- Réduit le risque de toxicité secondaire
- Les blocs sont très agréables au goût et ils ont un trou central pour un positionnement facile.
- Peuvent être utilisés à l'intérieur et à l'extérieur

Produit	
EN-1240	25 de 28 g / emb

Ingrédient actif
Bromethaline 0.01%
Commercial

Animaux ciblés
Pour contrôler les souris communes (Mus musculus), les rats surmulots et les rats noirs (Rattus norvegicus et Rattus rattus) dans les maisons, les édifices industriels et agricoles, les établissements de l'industrie alimentaire et autres constructions similaires. Les blocs doivent être placés dans des stations d'appâts verrouillées.

Mode d'emploi
RONGEURS CIBLÉS: les rats surmulots, les rats noirs et les souris communes
RATS: Utiliser de 2 à 6 blocs placés dans des stations d'appâts disposées à des intervalles d'une distance d'environ 6 à 9 mètres aux endroits appropriés près des zones infestées. Ajuster la quantité disponible d'appâts en fonction du niveau d'achalandage des rats à chaque emplacement.
SOURIS DOMESTIQUES: Utiliser 1 bloc par station d'appâts et les disposer à des intervalles de 2,5 à 4 mètres le plus près possible des zones infestées. Jusqu'à 2 blocs peuvent être placés à des points d'activités très élevés de la maison.

Ramik®

APPÂTS À BASE DE DIPHACINONE

Anti-rongeurs

Ramik® est offert dans divers formats et emballages afin de convenir à tous les types d'usage, que ce soit des infestations de rats dans les installations d'élevage de la volaille ou de simples apparitions occasionnelles de souris dans la maison.

Dans les pages suivantes, vous pourrez voir les formats offerts et les guides d'utilisation de chacun des produits Ramik® afin de choisir celui le mieux adapté à vos besoins.

- Anticoagulant de 1ière génération: Diphacinone
- Disponibles en différents formats tels qu'en granules, en sachets de granules, en bars et en blocs
- Aromatisés à saveur de poisson pour une plus grande appétence
- Mélange de grains de qualité alimentaire
- Peuvent être utilisés à l'intérieur et à l'extérieur
- Particulièrement adaptés pour les zones humides ou mouillées

Ingrédient actif
Diphacinone 0.005%
Commercial

Granules



Les granules Ramik® sont disponibles en dimension de 3/16".

Barres

Les barres Ramik® peuvent être utilisées en entier ou facilement en morceau individuel.

Blocs

Les barres Ramik® peuvent être utilisées en entier ou facilement en morceau individuel.

	Application	Utilisation prévue	Produit
RAMIK® VERT Sachets d'appâts 	**RONGEUR CIBLÉS :** Rats et souris **RATS:** Placer les appâts à 6-9 mètres d'intervalle. Déposer en chaque point 2 à 8 sachets d'appâts. **SOURIS:** Placer les sachets à un intervalle de 2 à 3 mètres. Établir des points d'appâts permanents et les réapprovisionner au besoin pour éviter une nouvelle prolifération de souris.	Pour le contrôle des souris et des rats, à l'intérieur et à l'extérieur. Placer les appâts dans des stations d'appâts protégées le long des murs, dans les coins et dans d'autres endroits dissimulés où les rats se nourrissent. S'assurer qu'il y ait un approvisionnement régulier d'appâts. Renouveler avec des appâts frais sans interruption pendant 15 jours ou jusqu'à ce que l'activité des souris cesse. Retirer rapidement tout appât avarié ou contaminé.	**HC-112950** 30 x 50 g Sachet d'appâts Chaudière de 1.5 kg **Commercial** **HC-110951** 150 x 50 g Sachet d'appâts Chaudière de 7.5 kg **Commercial**

	Application	Utilisation prévue	Produit
RAMIK® VERT Granules en vrac 	**RONGEURS CIBLÉS:** Rats, souris et écureuils terrestres **RATS :** Placer les appâts à 6-9 mètres d'intervalle. Déposer en chaque point au moins 115 grammes d'appâts. **SOURIS:** Placer les appâts à 2-3 mètres d'intervalle. Déposer en chaque point au moins 115 grammes en permanence pour éviter la réapparition des rongeurs. **ÉCUREUILS TERRESTRES:** **À LA MAIN:** Déposer 15 grammes (200 granules) d'appâts dans chaque trou. Revenir après 48 heures et déposer encore des appâts dans les trous où les appâts ont été mangés. Ne pas mettre d'autres appâts dans les trous où les appâts sont restés tel quel. Une troisième visite pourra s'avérer nécessaire pour assurer un contrôle parfait. **DANS DES CONTENANTS:** Observer le nombre approximatif d'écureuils sur une période de deux jours. Placer, tous les 30 à 60 mètres, des contenants ou boîtes d'appâts inviolables. Utiliser un contenant pour chaque quantité de 50 écureuils et déposer 500 grammes d'appâts dans chaque contenant. Vérifier tous les jours et approvisionner les contenants sans interruption pendant une période de trois semaines ou jusqu'à ce que les écureuils aient arrêté de manger les appâts.	Pour le contrôle des rats et des souris (à l'intérieur et à l'extérieur) et des écureuils terrestres (de type Colombien, Franklin, rayés et Richardson), dans les basses-cours, champs de récoltes, pépinières, endroits résidentiels et gazonnés (décoratifs ou pour le sport) et potagers. On peut utiliser ce produit dans les lieux humides ou détrempés comme les berges de rivière, les voies de chemin de fer, les lieux de chargement, dans ou autour des trous de rats, sous les greniers, le long des palissades, dans les décharges, etc. À l'extérieur, le produit doit être placé dans des boîtes verrouillées. On peut aussi utiliser efficacement ce produit dans des endroits secs à l'intérieur des bâtiments et en d'autres lieux protégés. Placer les appâts dans des boîtes inviolables le long des murs, dans les coins et dans des lieux dissimulés où les rats peuvent manger sans être dérangés. Il faut s'assurer chaque jour qu'il reste suffisamment d'appâts pour que les rongeurs en soient approvisionnés constamment. Maintenir un approvisionnement constant pendant au moins 15 jours. Appâter tant que les rongeurs continuent à se nourrir d'appâts. Remplacer les appâts s'ils sont humides et moisis.	**HC-112952** Chaudière de 10 kg **Commercial**

	Application	Utilisation prévue	Produit
BARRE RAMIK® Appâts en barres 	**RONGEURS CIBLÉS:** Rats et souris **RATS :** Placer les appâts à 6-9 mètres d'intervalle. Déposer en chaque point 2 à 8 sachets d'appâts. **SOURIS:** Placer les sachets à un intervalle de 2 à 3 mètres. Établir des points d'appâts permanents et les réapprovisionner au besoin pour éviter une nouvelle prolifération de souris.	Pour le contrôle des souris et des rats, à l'intérieur et à l'extérieur. Placer les appâts dans des stations d'appâts protégées le long des murs, dans les coins et dans d'autres endroits dissimulés où les rats se nourrissent. S'assurer qu'il y ait un approvisionnement régulier d'appâts. Renouveler avec des appâts frais sans interruption pendant 15 jours ou jusqu'à ce que l'activité des souris cesse. Retirer rapidement tout appât avarié ou contaminé.	**HC-116334** 4 barres de 454 g **Commercial**

	Application	Utilisation prévue	Produit
BLOCS RAMIK® Appâts en blocs 	**RONGEURS CIBLÉS:** Rats surmulots, rats noirs et souris communes. **RATS :** Placer les stations d'appâts à 6-9 mètres d'intervalle. Placer 113 à 454 grammes à chaque endroit. **SOURIS:** Placer les stations d'appâts à 2-3 mètres d'intervalle. Placer au moins 28 grammes d'appâts à chaque endroit. Maintenir un approvisionnement constant pendant au moins 15 jours.	Pour le contrôle des rats surmulots, des rats noirs et des souris communes à l'intérieur et à l'extérieur, dans un périmètre de 15 mètres autour des bâtiments (résidentiels, industriels et agricoles). Les appâts doivent être placés dans une station d'appâts protégée, le long de la clôture des propriétés, à l'extérieur du périmètre de 15 mètres tout en restant à 100 mètres des habitations à condition que la station d'appâts soit solidement fixée (par ex. clouée) à la clôture ou au sol.	**HC-116335** 28.3 g / bloc 64 blocs / seau **Commercial**

	Application	Utilisation prévue	Produit
RAMIK® MOUSE MAZE™ Station pré-appâtée jetable 	**RONGEURS CIBLÉS:** Souris communes Placer le Ramik® Mouse Maze™ à intérieur dans des endroits où les souris sont les plus susceptibles de trouver et de consommer l'appât. Les meilleurs lieux pour l'emplacement d'appâts sont les coins cachés, le long des murs et les endroits où les souris se nourrissent. Positionner le Ramik® Mouse Maze™ dans un périmètre de 1,5 à 3 mètres du lieu où les souris sont actives. Maintenir un approvisionnement ininterrompu d'appâts pour une période de 15 jours ou plus.	Ce produit ne peut être utilisé que pour contrôler les souris domestiques (Mus musculus) dans les maisons, et dans les bâtiments industriels, commerciaux ou agricoles. Ne pas placer d'appâts dans les zones où il y a une possibilité de contamination des aliments ou des surfaces qui entrent en contact avec la nourriture. Ne pas utiliser ce produit à l'extérieur ou dans des zones accessibles aux enfants, aux animaux domestiques ou à une faune non ciblée. Cette station d'appâtage n'est pas inviolable.	**HC-000600** Boîte de 2 12 / caisse **Nouveau Produit!** **HC-000700** Sac de 3 12 / caisse **DOMESTIQUE** **(aucun permis requis)**

	Application	Utilisation prévue	Produit
RAMIK® MOUSER RF™ Station d'appât rechargeable **Nouveau Produit!** 	**RONGEURS CIBLÉS:** Souris communes Placer le Ramik® Mouser RF™ à intérieur dans des endroits où les souris sont les plus susceptibles de trouver et de consommer l'appât. Les meilleurs lieux pour l'emplacement d'appâts sont les coins cachés, le long des murs et les endroits où les souris se nourrissent. Positionner le Ramik® Mouser RF™ dans un périmètre de 1,5 à 3 mètres du lieu où les souris sont actives. Maintenir un approvisionnement ininterrompu d'appâts pour une période de 15 jours ou plus.	Ce produit peut être utilisé pour contrôler les souris domestiques (Mus musculus) dans les maisons, et dans les bâtiments industriels, commerciaux ou agricoles. Ne pas placer d'appâts dans les zones où il y a une possibilité de contamination des aliments ou des surfaces qui entrent en contact avec la nourriture. Ne pas utiliser ce produit à l'extérieur. Cette station d'appât peut être utilisée à l'intérieur en présence d'enfant si les instructions inscrites sur l'étiquette sont respectées.	**HC-000800** 1 station d'appât rechargeable et 8 blocs de 28,3g dans un sac refermable **HC-000900** 1 station d'appât rechargeable et 16 blocs de 28,3g dans un sac refermable **DOMESTIQUE** **(aucun permis requis)**

Ramik brown

Appâts à base de Diphacinone

Anti-rongeurs, résistants aux intempéries

Rodenticide résistant aux intempéries pour éliminer les souris des vergers, des plantations d'arbres de Noël, des zones récemment reboisées, des brise-vents et des pépinières.

- Résistants aux intempéries
- Appâts à base de diphacinone, efficaces contre les rats, les souris et les campagnols
- Granules de 5 mm aromatisées aux pommes
- Formule extrudée qui s'étale uniformément et avec précision
- Produit éprouvé pour le verger

Ingrédient actif
Diphacinone 0.005%
Commercial

	Application	Utilisation prévue	Produit
RAMIK® BROWN™ Granules en vrac	**RONGEURS CIBLÉS:** Rats, souris et campagnols **APPLICATION:** Épandre les granules à raison de 22 kg par hectare en deux applications de 11 kg chacune. Ceci est l'équivalent de 140 granules (une petite poignée) tous les 10 m^2 en deux applications de 70 granules chacune. Les applications peuvent être effectuées entre 20 et 40 jours d'intervalle (selon les observations).	Pour l'élimination des souris (Microtus sp et Peromyscus sp) dans les vergers d'arbres fruitiers producteurs et non-producteurs (à noyaux et à pépins), les plantations d'arbres de Noël, les zones récemment reboisées, les brise-vents et les pépinières. Dans les vergers, ne pas appliquer tant que les fruits n'ont pas été cueillis et que tous les fruits cueillis n'ont pas été ramassés. L'application des appâts doit commencer à la fin de l'automne (juste avant la première neige). Ne pas appliquer après le 31 mars. La zone traitée doit être évaluée pendant les périodes de dégel, pendant l'hiver et immédiatement après la fonte des neiges. Une nouvelle application d'appâts doit être effectuée dans la zone s'il y a de nouveaux dommages visibles sur les troncs.	**HC-110924** En vrac 20 kg **Commercial**

Havoc®

APPÂT À BASE DE BRODIFACOUM

Anti-rongeurs

Le brodifacoum est l'ingrédient actif de type anticoagulant le plus puissant disponible sur le marché. Les produits Havoc® combinent le brodifacoum avec un mélange spécial d'ingrédients d'appâts très attractifs manufacturés par des techniques de transformation brevetées. Le résultat est un appât de qualité supérieure qui tue dès la première utilisation, lequel est disponible en différents formats.

Les appâts Havoc® sont disponibles en sac de granules et en blocs. La conception de Havoc-XT Blok™ comprend un trou au centre permettant le placement optimal des appâts sécurisés.

Dans les pages suivantes, vous pourrez voir les formats offerts et les guides d'utilisation de chacun des produits Havoc® afin de choisir celui le mieux adapté à vos besoins.

- Anticoagulant de deuxième génération - le plus puissant disponible
- Peut tuer les rats et les souris en une seule nuit d'alimentation
- Disponible en sachets d'appâts et en blocs
- Contient du Bitrex®, un ingrédient dissuasif pour les enfants et la faune non-ciblée
- Pour utilisation à l'intérieur seulement

Ingrédient actif
Brodifacoum 0.005%
Commercial

La forme unique des blocs Havoc-XT® facilite leur grignotage par les rongeurs

	Application	Utilisation prévue	Produit
HAVOC® Sachets double d'appâts de 100 g (2x50 g)	**RONGEURS CIBLÉS:** Rats surmulots, rats noirs et souris communes. **RATS :** Placer de 50 à 100 g, soit 1 ou 2 sachets d'appâts rodenticides HAVOC pour rats et souris à des intervalles de 4,5 à 9 mètres. Renouveler avec des appâts frais sans interruption pendant 10 jours ou jusqu'à ce que l'activité des rats cesse. **SOURIS:** Ouvrir un sachet et déposer de 15 à 25 g d'appâts rodenticides HAVOC® pour rats et souris à des intervalles de 2 à 4 mètres. Renouveler avec des appâts frais sans interruption pendant 15 jours ou jusqu'à ce que l'activité des souris cesse.	Utiliser les appâts pour supprimer le surmulot (Rattus norvegicus), le rat noir (Rattus rattus) et la souris commune (Mus musculus) dans les bâtiments de ferme. Déterminer les zones où les rats et/ou les souris seront les plus susceptibles de trouver et d'ingérer l'appât. Généralement, les meilleurs endroits pour déposer les appâts sont le long des murs, près des ouvertures portant des traces de rongeurs, dans les trous ou à côté, dans les coins et endroits dissimulés, entre les planchers et les murs ou, encore, aux endroits où l'on a observé des rongeurs ou des signes de leur présence. N'utiliser que dans les zones qui ne sont pas directement liées à la transformation des aliments, c'est-à-dire dans les zones où il n'y a pas d'aliments de consommation humaine ou animale et où les aliments et l'équipement d'emballage et de manutention ne sont jamais ouverts ou exposés.	**HC-116372** Chaudière de 4 kg 40 sachets double **Commercial** **HC-116358** Chaudière de 8 kg 80 sachets double **Commercial**

	Application	Utilisation prévue	Produit
HAVOC-XT® BLOK™ Appâts en blocs	**RONGEURS CIBLÉS:** Rats surmulots, rats noirs et souris communes **RATS :** Placer de 5 à 10 appâts Havoc-XT® Blok™ à des intervalles de 5 à 10 mètres. Renouveler avec des appâts frais sans interruption pendant 10 jours ou jusqu'à ce que l'activité des rats cesse. **SOURIS:** Placer un appât Havoc-XT® Blok™ à un intervalle de 2,5 à 4 m entre chaque emplacement. Une plus grande quantité peut être nécessaire là où il y a une activité intense des souris. Renouveler avec des appâts frais sans interruption pendant 15 jours ou jusqu'à ce que l'activité des souris cesse.	Utiliser les appâts pour supprimer le surmulot (Rattus norvegicus), le rat noir (Rattus rattus) et la souris commune (Mus musculus) dans les bâtiments de ferme. Déterminer les zones où les rats et/ou les souris seront les plus susceptibles de trouver et d'ingérer l'appât. Généralement, les meilleurs endroits pour déposer les appâts sont le long des murs, près des ouvertures portant des traces de rongeurs, dans les trous ou à côté, dans les coins et endroits dissimulés, entre les planchers et les murs ou, encore, aux endroits où l'on a observé des rongeurs ou des signes de leur présence. N'utiliser que dans les zones qui ne sont pas directement liées à la transformation des aliments, c'est-à-dire dans les zones où il n'y a pas d'aliments de consommation humaine ou animale et où les aliments et l'équipement d'emballage et de manutention ne sont jamais ouverts ou exposés. Pour usage intérieur seulement	**HC-116361** 4.5 kg 227 blocs de 20 g **Commercial**

ASTUCES POUR CONTRÔLER LES RONGEURS À L'AIDE DE STATIONS D'APPÂTS

- **Utiliser le nombre adéquat de stations:** Pour une efficacité optimale, les stations d'appâts devraient être placées selon les directives de chaque produit.
- **Garder les appâts frais:** Après un remplissage initial des stations d'appâts, vérifier à tous les 7 jours. Remplacer les appâts mangés et continuer de vérifier une fois par semaine pendant trois semaines. Après ce délai, vérifier les stations chaque 30 jours ou selon le besoin. Nettoyer les stations lorsque nécessaire afin de s'assurer que les appâts restent appétissants.

RODENT CAFE®

Ramik

Station d'appâts

HC-660 (27 x 30 x 8 cm)

- Conception compacte qui accentue l'activité des rongeurs dans la station d'appâts
- Compartiment de grande taille offrant le positionnement des appâts de manière verticale et horizontale
- Conçue de façon à prévenir l'accumulation d'eau dans le compartiment intérieur contenant les appâts
- Conception robuste résistant au poids d'un homme et ce, grâce à d'épaisses parois de plastique
- L'ouverture en charnière assure des années de service sans tracas comparativement aux stations standards
- Clé robuste et ensemble de tiges inclus
- Utiliser avec Ramik® Blocks, Havoc-XT® et Terminator® (vendu séparément)

HC-660

RAMIK® STATION D'APPÂTS

HC-500 (23.75 x 17.5 x 9 cm)

HC-440 (13.75 x 10 x 4 cm)

- Verrouillables et inviolables, tiges verticales intérieures pour fixer l'appât
- 2 ouvertures pour les rongeurs

HC-440

HC-500

Trappe à souris Multi-Catch

Ramik

HC-945

- Peut contenir plus d'une douzaine de souris à la fois
- Aucun assemblage requis
- Peut être utilisée avec ou sans piège collant (un inclus)
- Sécuritaire pour les enfants et les animaux de compagnie
- Capture sécuritaire de l'animal

Pièges collants et plaques collantes

Ramik

HC-116220 Piège collant à souris (4/emb)

HC-116230 Piège collant à rats (2/emb)

HC-940 Plaque collante à souris et insectes (4/emb)

- Non toxique, jetable et prêt à l'emploi
- Piège sans poison, nul besoin d'un appât additionel
- Colle de qualité

HC-116230

HC-116220

HC-940

Trappes Snap Traps

Ramik

HC-116221 Snap Traps pour souris (2/emb)

HC-116231 Snap Traps pour rats (1/emb)

- Disponible en deux formats : rats (grand) et souris (petit)
- Facile à utiliser, ressort de tension puissant
- Piège durable en plastique
- Réservoir pour l'appât

HC-116221

HC-116231

Piège non létal à souris à 2 entrées

KERBL

299495

- Piège en plastique avec clapets d'entrées métalliques
- 2 entrées latérales
- Ouverture facile
- Avec fenêtre pratique rabattable

299495

299495

Piège non létal cylindrique

KERBL

299498 Piège à souris

299497 Piège à rats

- Pour plusieurs souris
- Piège tube cylindrique en plastique avec clapets d'entrée métalliques
- Avec dispositif de fixation pour positionnement horizontal ou vertical

- Ces produits ont été conçus selon les plus récentes découvertes faites sur les animaux ciblés, garantissant ainsi une capture sécuritaire de l'animal.

299498

299498

299497

299497

SyrVet Canada

1-888-779-7838

www.syrvetcanada.ca